

Prefeitura Municipal de Joinville
Hospital Municipal São José

Processo Seletivo para Odontólogo Residente 2010/2011 • Edital nº 02/2010

<http://hmsj.fepese.org.br>

Caderno de Prova



23 de novembro



das 8:30 às 11:30 h



3 h de duração*



30 questões



P8

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo-facial



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo-facial (30 questões)

1. Quanto aos músculos da mastigação, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Todos os músculos da mastigação são derivados do 1º arco faríngeo.
- b. () Todos os músculos da mastigação se originam no crânio e inserem-se na mandíbula.
- c. () O músculo temporal é considerado o principal músculo postural relacionado à mastigação.
- d. () Todos os músculos da mastigação são inervados pelo nervo mandibular (V3), uma das divisões do nervo trigêmeo (V).
- e. (X) A porção superficial do músculo masseter tem origem na borda medial do arco zigomático e na borda inferior do terço posterior do arco zigomático e inserção na porção súpero-lateral do ramo mandibular.

2. Trata-se do tumor mais comum das glândulas salivares, ocorrendo em pacientes dentro de uma larga e variada faixa etária a partir da segunda década de vida e preferencialmente em mulheres. Histopatologicamente, consiste em uma proliferação encapsulada do ducto ou de células mioepiteliais, sendo sustentado por um estroma que varia de um colágeno hialinizado denso a uma substância grosseira e mal definida.

Assinale a alternativa que representa melhor a descrição acima:

- a. () Tumor de Warthin
- b. () Adenoma canalicular
- c. (X) Adenoma pleomórfico
- d. () Adenocarcinoma polimorfo
- e. () Adenocarcinoma de células acinares

3. Assinale a alternativa que representa uma desordem autossômico-dominante que afeta ambas as dentições, sendo que o esmalte e a dentina coronários são bem formados e se apresentam clinicamente normais. Já a dentina radicular é extremamente desorganizada, frequentemente resultando em raízes curtas e com os canais radiculares totalmente obliterados:

- a. () Taurodontia
- b. () Odontodisplasia
- c. (X) Displasia dentinária tipo I
- d. () Displasia dentinária tipo II
- e. () Displasia hipoidrótica hereditária

4. Cirurgia endodôntica é o tratamento ou prevenção da patologia perirradicular por meio de abordagem cirúrgica.

Quanto à cirurgia endodôntica, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () O sucesso da cirurgia apical varia consideravelmente, dependendo da razão e da natureza do procedimento.
- b. (X) A cicatrização após a cirurgia endodôntica usualmente é demorada porque a maioria dos tecidos manipulados é contaminada e o reposicionamento dos tecidos favorece a cicatrização por segunda intenção.
- c. () Quando o tratamento endodôntico convencional é possível, está contraindicada a cirurgia periapical.
- d. () É indicação para cirurgia periapical endodôntica a presença de material não removível ou elementos irrecuperáveis dentro do canal, impedindo o tratamento ou o retratamento do canal.
- e. () Dentes com raízes muito pequenas e com pouco suporte ósseo não são bons candidatos a cirurgia endodôntica periapical.

5. Biópsia é a remoção de tecido de um indivíduo vivo para exame diagnóstico. De todos os procedimentos diagnósticos realizados em laboratório, é o exame menos duvidoso e deve sempre ser realizado quando um diagnóstico definitivo não possa ser obtido utilizando-se modalidades diagnósticas menos invasivas.

Quanto à biópsia, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. (X) A biópsia incisional implica a remoção de toda a lesão no momento em que se realiza o procedimento cirúrgico diagnóstico.
- b. () A biópsia por aspiração pode fornecer informação de extremo valor sobre a natureza da lesão e causa somente pequeno desconforto ao paciente.
- c. () Qualquer lesão radiolúcida nos ossos maxilares deve ser aspirada antes de intervenção cirúrgica a fim de descartar uma lesão vascular que possa resultar em hemorragia.
- d. () Toda mucosa oral é passível de biópsia, e a técnica apenas difere de acordo com a anatomia local e o tamanho e tipo de lesão.
- e. () Deve-se utilizar uma lâmina afiada para incisar os tecidos para biópsia.

6. Quanto aos sistemas de classificação de dentes impactados, é **correto** afirmar:

- a. () Na impactação de classe 1 de Pell e Gregory, o plano oclusal do terceiro molar está no mesmo nível oclusal do plano oclusal do segundo molar.
- b. () A combinação da impactação distoangular com classe 3 de profundidade e classe C de ramo torna a extração moderadamente difícil.
- c. () Numa impactação de classe 2 de Pell e Gregory, o terceiro molar está abaixo da linha cervical do segundo molar.
- d. () Numa impactação de classe B de Pell e Gregory, o terceiro molar está completamente imerso no osso do ramo da mandíbula.
- e. (X) A impactação mesioangular é a de maior prevalência, e é tida comumente como a menos difícil de ser solucionada.

7. Assinale a alternativa que **não** diz respeito ao abscesso gengival:

- a. () Geralmente limitado à gengiva marginal ou à papila interdental.
- b. () Aparece como um inchaço avermelhado com superfície lisa e brilhante.
- c. () O dente adjacente geralmente fica sensível à percussão.
- d. (X) É uma lesão de crescimento lento, indolor e localizada.
- e. () Permitindo-se o seu progresso, a lesão em geral rompe-se espontaneamente.

8. Assinale a alternativa que indica o nervo que se origina nos ramos do gânglio pterigopalatino e é responsável pelo suprimento nervoso da gengiva e mucosa do palato da área na região pré-molar para a margem posterior do palato duro para a linha média:

- a. () Nervo faríngeo
- b. () Nervo nasopalatino
- c. (X) Nervo palatino maior
- d. () Nervo palatino menor
- e. () Nervo do canal pterigóideo

9. Quanto ao controle químico da placa, assinale a alternativa **correta**:

- a. (X) A clorexidina é um diguanido-hexano com acentuadas propriedades antisépticas.
- b. () O controle mecânico da placa não é necessário atualmente e pode ser substituído pelo controle químico da placa.
- c. () O agente antiplaca que mostrou os resultados mais positivos é o cloreto de cetilpiridínio.
- d. () A sanguinarina é classificada como um agente antimicrobiano do grupo dos óleos essenciais.
- e. () O benzoato de sódio está disponível para bochecho com potencial antimicrobiano idêntico ao da clorexidina.

10. Sobre o hemograma e sua interpretação, assinale a alternativa **incorreta**:

- a. () Desvio à direita significa uma quantidade maior de neutrófilos segmentados no sangue periférico, representando uma infecção crônica.
 - b. (X) Volume globular médio (VGM) representa em cifras absolutas a proporção real de hemoglobina existente, em termos médios, em cada hemácia.
 - c. () O conhecimento do hematócrito é importante naqueles pacientes que vão se submeter a cirurgia bucal de maior porte, sob anestesia local ou geral.
 - d. () Dosagem de hemoglobina é a medida da quantidade de hemoglobina existente em 100ml de sangue e expressa em gramas.
 - e. () A hemossedimentação é a velocidade de sedimentação dos eritrócitos.
-

11. Assinale a alternativa que representa uma contraindicação ao uso de uma prótese adesiva:

- a. (X) Espaços protéticos extensos.
 - b. () Contenção de dentes abalados periodontalmente.
 - c. () Contenção de dentes tratados ortodonticamente.
 - d. () Como elemento de manutenção de contenção cêntrica e dimensão vertical em prótese parcial removível.
 - e. () Como elemento de restabelecimento da guia anterior.
-

12. Os grampos são elementos mecânicos responsáveis pela retenção de uma prótese parcial removível.

Qual de seus elementos é responsável pela propriedade de reciprocidade?

- a. () Apoio incisal
- b. () Apoio oclusal
- c. () Conector menor
- d. (X) Braço de oposição
- e. () Ponta ativa do braço de retenção

13. O bloqueio do nervo alveolar inferior, comumente denominado bloqueio do nervo mandibular, é a técnica de injeção mais usada e, possivelmente, a mais importante em odontologia.

Dentre as alternativas abaixo, assinale o nervo que **não** é anestesiado por esta técnica:

- a. (X) Bucal
 - b. () Lingual
 - c. () Incisivo
 - d. () Alveolar inferior
 - e. () Mentoniano
-

14. De acordo com a classificação de Lekholm e Zarb (1985) quanto à qualidade óssea, assinale a alternativa que representa o tipo de osso que tem como característica: apresentar camada delgada de osso compacto, envolvendo o núcleo de osso trabeculado de pouca densidade, porém em quantidade suficiente.

- a. () Classe I
 - b. () Classe II
 - c. (X) Classe III
 - d. () Classe IV
 - e. () Classe V
-

15. A biologia, bem como a mecânica de cada condição do paciente, deveriam ser avaliadas e usadas no máximo potencial para suportar os tecidos ao redor do implante. Para o planejamento de reabilitação do paciente com rebordos comprometidos, é importante que o cirurgião-dentista tenha conhecimento da classificação dos defeitos de rebordo proposta por Seibert (1986).

De acordo com a classificação de Seibert, assinale a alternativa, que representa um rebordo com característica altura diminuída com preservação da espessura:

- a. () Classe I
- b. (X) Classe II
- c. () Classe III
- d. () Classe IV
- e. () Classe V

16. Desde a década de 1990 o Brasil adotou a Estratégia Saúde da Família como modelo de reorientação da atenção básica do Sistema Único de Saúde.

Assinale a alternativa que **não** descreve um de seus princípios ou características:

- a. Territorialização
 - b. Caráter substitutivo
 - c. Cadastramento familiar
 - d. Alta complexidade tecnológica
 - e. Trabalho em equipe multiprofissional
-

17. O índice CPO-D aos 12 anos de idade é um dos mais importantes na área de saúde bucal.

Assinale a alternativa que indica corretamente, o seu valor mais recente para o Brasil (2002-2003).

- a. Abaixo de 3
 - b. Entre 5 e 7
 - c. Entre 9 e 11
 - d. Entre 12 e 15
 - e. Acima de 16
-

18. A Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) prevê que “a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo”.

Trata-se de qual princípio do SUS?

- a. Equidade
 - b. Regionalização
 - c. Universalidade
 - d. Hierarquização
 - e. Integralidade da atenção
-

19. Analise o texto abaixo:

“A higienização das mãos, antecedendo procedimentos cirúrgicos, deve ser sempre realizada com, preferencialmente que apresente(m) efeito, para eliminar a microbiota transitória das mãos da equipe cirúrgica, reduzir a microbiota residente durante o procedimento e manter a multiplicação microbiana lenta”.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. benzenos ; efêmero
 - b. antisépticos ; residual
 - c. água clorada ; latente
 - d. sabonete líquido simples ; rápido
 - e. sabonete em barra ; completo
-

20. Soluções alcoólicas para fricção são utilizadas para aplicação na mãos visando a redução do número viável de micro-organismos.

Essas soluções costumeiramente contêm:

- a. 1% de agentes aniônicos.
 - b. 5% de clorexidina.
 - c. 8% a 15% de isopropanolol.
 - d. 10 a 20% de etanol.
 - e. 60% a 90% de etanol.
-

21. De qual substância a solução a 2% é indicada para esterilização química de artigos odontológicos?

- a. Álcool
- b. Formaldeído
- c. Glutaraldeído
- d. Ácido paracético
- e. Hipoclorito de sódio

22. É valiosa para detectar cáries interproximais em estágios iniciais de desenvolvimento antes de elas se tornarem clinicamente visíveis.

Assinale a alternativa que indica a radiografia a que se refere a afirmação acima.

- a. () Oclusal
 - b. () Paralelismo
 - c. () Bissetora
 - d. (X) Bite-wing
 - e. () Periapical
-

23. Assinale a alternativa que **não** descreve uma vantagem da radiografia panorâmica:

- a. () Baixa dose de radiação ao paciente.
 - b. () Baixo nível de desconforto ao paciente.
 - c. () Permite ampla visibilidade dos ossos faciais.
 - d. () Permite ampla visibilidade dos dentes.
 - e. (X) Impossibilidade de sobreposição das superfícies proximais dos pré-molares.
-

24. Abaixo estão descritos achados radiográficos:

1. Presença de linha radiotransparente dentro dos limites anatômicos da estrutura.
2. Mudança no contorno anatômico normal ou na forma da estrutura.
3. Aumento na densidade óssea.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas que são sinais gerais de fratura de osso ou dente.

- a. () Apenas a afirmativa 1.
- b. () Apenas a afirmativa 2.
- c. () Apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () Apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. (X) As afirmativas 1, 2 e 3.

25. Sobre os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol cita-se como vantagem:

- a. () Hidratação dentinária.
 - b. (X) Bom isolante térmico.
 - c. () Indução de mineralização.
 - d. () Não possui ação quelante sobre a dentina.
 - e. () Não apresenta ação irritante quando em contato direto com a polpa.
-

26. No caso de dentes decíduos, configura-se como indicação de pulpotomia:

- a. (X) Ausência de abscesso ou fístula.
 - b. () Presença de dentes muito destruídos.
 - c. () Presença de radiolucidez na bifurcação de raízes.
 - d. () Presença de sangramento excessivo e persistente no local da amputação da polpa coronária.
 - e. () Evidência de reabsorção interna.
-

27. Sobre os testes clínicos endodônticos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () A percussão pode ser realizada na horizontal ao longo eixo do dente ou na vertical.
- b. () Dentes que na palpação apresentam sensibilidade são suspeitos de presença de alteração periapical.
- c. () O alívio ao teste de pressão oclusal pode ser indicativo de abscesso periodontal.
- d. (X) O teste de mobilidade é vital, pois a presença de mobilidade significa necessariamente presença de patologia.
- e. () O teste de vitalidade pulpar é de grande relevância para a obtenção de um diagnóstico seguro.

28. O uso de grampos para a conformação do isolamento absoluto é de extrema relevância nos atos endodônticos.

Assinale o conjunto de dentes indicados para uso dos grampos 200 a 2005:

- a. Molares
 - b. Caninos
 - c. Pré-molares
 - d. Incisivos inferiores
 - e. Incisivos superiores
-

29. Assinale a alternativa que **não** descreve uma medida de eficácia dos anti-inflamatórios não-esteroides (AINE):

- a. Diminuição da dor
 - b. Diminuição do eritema
 - c. Diminuição do edema
 - d. Diminuição do desconforto
 - e. Diminuição da capacidade funcional
-

30. Sobre a lidocaína, anestésico local utilizado na odontologia, é **correto** afirmar:

- a. Apresenta 20 mg/kg como dose máxima.
- b. A sua dose máxima total é de 300 mg.
- c. Não chega a ser absorvida pelo trato gastrointestinal.
- d. O início do efeito após dose única intravenosa ocorre em 4-5 minutos.
- e. A meia-vida de distribuição é de 60-120 minutos.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>